

УДК 517.9+517.5

ОБ ОДНОМ ПРИМЕНЕНИИ СЛАБО ДОСТАТОЧНЫХ МНОЖЕСТВ

А. В. Абанин

*Академику С. М. Никольскому
к его столетнему юбилею*

Приводится применение теории слабо достаточных множеств к задаче об эпиморфности операторов типа свертки.

Важную роль в теории нормально разрешимых операторов и ее приложениях сыграла работа С. М. Никольского [1], которая впоследствии получила дальнейшее развитие в различных направлениях в исследованиях многих математиков (см. краткий обзор Ю. Ф. Коробейника [2] в этом номере ВМЖ). В настоящей статье будет представлено применение теории слабо достаточных множеств к вопросу о нормальной разрешимости оператора умножения в весовых пространствах целых функций и двойственной задаче об эпиморфности оператора типа свертки.

Пусть H_j , где $j = 1, 2$, — рефлексивные пространства Фреше с топологиями, задаваемыми наборами преднорм $(|\cdot|_{n,j})_{n=1}^\infty$, которые мы, не ограничивая общности, будем считать неубывающими по n . Предположим, что в $H_1 \cap H_2$ имеется такая система ненулевых элементов $\mathcal{E}(\mathbb{C}) := \{e(\lambda) : \lambda \in \mathbb{C}\}$, что $\ln |e(\lambda)|_{n,j}$ — локально ограниченные в \mathbb{C} функции ($n \in \mathbb{N}; j = 1, 2$), и что обобщенное преобразование Лапласа $\mathcal{F} : F \in H'_j \mapsto F(e(\lambda))$ является топологическим изоморфизмом сильного сопряженного к H_j пространства на весовое пространство целых функций $E_j = \operatorname{ind}_n E_{n,j}$, где

$$E_{n,j} := \left\{ f \in H(\mathbb{C}) : \|f\|_{n,j} := \sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|f(\lambda)|}{|e(\lambda)|_{n,j}} < \infty \right\}$$

— банахово пространство с нормой $\|\cdot\|_{n,j}$ ($n \in \mathbb{N}; j = 1, 2$). Обозначим через $M(E_2, E_1)$ класс всех мультипликаторов из E_2 в E_1 , т. е. тех целых функций μ , для которых $\mu f \in E_1$ при всех $f \in E_2$. Отметим, что структура классов мультипликаторов различных весовых пространств целых функций изучалась ранее Ю. Ф. Коробейником и автором (см., например, [3] и [4]). Предположим, что класс $M(E_2, E_1)$ нетривиален, зафиксируем $\mu(\lambda) \neq 0$ из $M(E_2, E_1)$ и рассмотрим оператор умножения $M_\mu : f \mapsto \mu f$. Из теоремы о замкнутом графике следует, что M_μ действует из E_2 в E_1 непрерывно. Поэтому сопряженный к M_μ оператор T_μ , который мы, следуя А. Мартино, будем называть оператором свертки, является линейным непрерывным оператором из H_1 в H_2 . Из определения сопряженного оператора и наших предположений вытекает, что $T_\mu(e(\lambda)) = \mu(\lambda)e(\lambda)$ при всех $\lambda \in \mathbb{C}$.

Наша цель — при некоторых дополнительных ограничениях дать в терминах слабо достаточных множеств близкое к точному описание тех мультипликаторов μ , для которых оператор $T_\mu : H_1 \rightarrow H_2$ сюръективен. Отметим, что в силу общей теории двойственности сюръективность $T_\mu : H_1 \rightarrow H_2$ эквивалентна нормальной разрешимости оператора умножения $M_\mu : E_2 \rightarrow E_1$.

Напомним понятие слабо достаточного множества, введенное Д. М. Шнайдером в [5]. Пусть $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$ — последовательность локально ограниченных в \mathbb{C} функций. Ассоциируем с Φ банаховы пространства целых функций

$$E(\varphi_n) := \left\{ f \in H(\mathbb{C}) : \|f\|_n := \sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|f(\lambda)|}{\exp \varphi_n(\lambda)} < \infty \right\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и введем в рассмотрение векторное пространство $E(\Phi) := \bigcup_{n=1}^\infty E(\varphi_n)$. Для произвольного подмножества S в \mathbb{C} определим полунормированные пространства

$$E(\varphi_n; S) := \left\{ f \in E(\Phi) : \|f\|_{n,S} := \sup_{\lambda \in S} \frac{|f(\lambda)|}{\exp \varphi_n(\lambda)} < \infty \right\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и обозначим через τ_S топологию внутреннего индуктивного предела $\text{ind}_n E(\varphi_n; S)$ в $E(\Phi)$. Всегда τ_S мажорируется топологией $\tau_{\mathbb{C}}$. В случае, когда τ_S совпадает с $\tau_{\mathbb{C}}$, множество S называется *слабо достаточным* для $E(\Phi)$.

Положим $\varphi_{n,j}(\lambda) := \ln |e(\lambda)|_{n,j}$ и $\Phi_j := (\varphi_{n,j})_{n=1}^\infty$, где $\lambda \in \mathbb{C}$, $j = 1, 2$. Тогда введенные выше пространства E_j не что иное, как $E(\Phi_j)$, $j = 1, 2$. Далее, назовем замкнутое множество V на плоскости (Φ_1, Φ_2) -*исключительным множеством функции μ* , если

$$(\forall n)(\exists m)(\exists R > 0)(\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus V) (|\lambda| > R \Rightarrow \ln |\mu(\lambda)| \geq \varphi_{n,1}(\lambda) - \varphi_{m,2}(\lambda) - R).$$

Предложение 1. Если для функции μ существует такое (Φ_1, Φ_2) -исключительное множество V , что $\mathbb{C} \setminus V$ слабо достаточно для $E_2 (= E(\Phi_2))$, то оператор свертки T_μ — эпиморфизм H_1 на H_2 , или, что равносильно, M_μ — нормально разрешимый оператор из E_2 в E_1 .

◁ В соответствии с теоремой о дискретизации слабо достаточных множеств, установленной О. В. Епифановым в [6], $\mathbb{C} \setminus V$ содержит последовательность $\Lambda = (\lambda_k)_{k=1}^\infty$ с единственной предельной точкой на бесконечности, которая образует слабо достаточно для E_2 множество. Тогда по теореме К из [7] система $\mathcal{E}(\Lambda) := (e(\lambda_k))_{k=1}^\infty$ является абсолютно представляющей в H_2 , т. е. каждый элемент y из H_2 разлагается в абсолютно сходящийся в H_2 ряд $y = \sum_{k=1}^\infty c_k e(\lambda_k)$ (здесь $c_k = c_k(y)$ — комплексные числа, определяемые по y , возможно, неоднозначно; по поводу общего понятия абсолютно представляющих систем в локально выпуклых пространствах и основных свойств таких систем см. обзорную статью Ю. Ф. Коробейника [8]). Так как по условию V является (Φ_1, Φ_2) -исключительным множеством функции μ , то для любого n существуют m , $R > 0$ и $N \in \mathbb{N}$ такие, что для $k > N$

$$\left| \frac{c_k}{\mu(\lambda_k)} \right| |e(\lambda_k)|_{n,1} \leq e^R |c_k| \exp(\varphi_{m,2}(\lambda_k) - \varphi_{n,1}(\lambda_k)) |e(\lambda_k)|_{n,1} = e^R |c_k| |e(\lambda_k)|_{m,2},$$

где N выбрано настолько большим, что $|\lambda_k| > R$ при $k > N$. Поэтому ряд $\sum_{k=1}^\infty \frac{c_k}{\mu(\lambda_k)} e(\lambda_k)$ сходится абсолютно в H_1 к некоторому элементу x_y . Ясно, что $T_\mu x_y = y$, и тем самым предложение доказано. ▷

ЗАМЕЧАНИЕ. Изложенный в доказательстве предложения 1 прием использования абсолютно представляющих систем в вопросах разрешимости функциональных уравнений и ранее применялся А. Ф. Леонтьевым, В. Х. Мусояном, Ю. Ф. Коробейником, Ю. Н. Фроловым и др. (см. по этому поводу, например, [9]).

Покажем теперь, как при некоторых дополнительных ограничениях можно получить результат обратного по отношению к предложению 1 характера.

Положим

$$M_0(E_2, E_1) := \{\mu \in H(\mathbb{C}) : (\forall n)(\exists m) |f(\lambda)| = O(e^{\varphi_{m,1}(\lambda) - \varphi_{n,2}(\lambda)}) \text{ в } \mathbb{C}\}.$$

Нетрудно видеть, что $M_0(E_2, E_1) \subset M(E_2, E_1)$. Одно из ограничений, которое мы будем использовать ниже, состоит в требовании справедливости равенства $M(E_2, E_1) = M_0(E_2, E_1)$. Отметим, что это равенство заведомо выполняется для так называемых густых пространств E_2 (см. предложение 3 из [3]) и что простые по форме условия густоты имеются в [3] и [4].

Предложение 2. Допустим, что верхняя огибающая $\varphi_2(\lambda) := \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{n,2}(\lambda)$ весовой последовательности Φ_2 принимает всюду в \mathbb{C} конечные значения, а Φ_1 такова, что

$$(\forall n)(\exists m) \lim_{\lambda \rightarrow \infty} (\varphi_{m,1}(\lambda) - \varphi_{n,1}(\lambda)) = +\infty. \quad (1)$$

Положим

$$V_{n,\mu} := \{\lambda \in \mathbb{C} : \ln |\mu(\lambda)| \leq \varphi_{n,1}(\lambda) - \varphi_2(\lambda)\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Если $M(E_2, E_1) = M_0(E_2, E_1)$, то из нормальной разрешимости оператора $M_\mu : E_2 \rightarrow E_1$ или, что то же самое, эпиморфности оператора $T_\mu : H_1 \rightarrow H_2$ следует, что при любом $n \in \mathbb{N}$ множество $\mathbb{C} \setminus V_{n,\mu}$ слабо достаточно для E_2 .

◁ Зафиксируем произвольное $k \in \mathbb{N}$ и рассмотрим $f \in E_2$ с оценкой $|f(\lambda)| = O(\exp \varphi_{k,2}(\lambda))$ вне $V_{n,\mu}$. Не ограничивая общности, можно считать, что $k \geq n$. Так как $\mu \in M(E_2, E_1)$ и по условию $M(E_2, E_1) = M_0(E_2, E_1)$, то при некотором $l \geq k$ всюду в \mathbb{C} имеет место соотношение $|\mu(\lambda)| = O(\exp(\varphi_{l,1}(\lambda) - \varphi_{k,2}(\lambda)))$. Поэтому

$$|f(\lambda)\mu(\lambda)| = O(\exp \varphi_{l,1}(\lambda)) \text{ вне } V_{n,\mu}.$$

Далее, из принадлежности f пространству E_2 и определения $V_{n,\mu}$ следует, что

$$|f(\lambda)\mu(\lambda)| = O(\exp \varphi_{n,1}(\lambda)) \text{ на } V_{n,\mu}.$$

Таким образом,

$$|f(\lambda)\mu(\lambda)| = O(\exp \varphi_{l,1}(\lambda)) \text{ всюду в } \mathbb{C}. \quad (2)$$

Отметим, что номер l зависит лишь от k и μ .

Теперь воспользуемся тем, что оператор M_μ нормально разрешим, т. е. тем, что $M_\mu(E_2)$ — замкнутое подпространство в E_1 . Поскольку E_1 , в силу условия (1), — (DFS) -пространство (или в терминологии Себастьяна-и-Сильва LN^* -пространство; см. по поводу таких пространств и их свойств обзор В. В. Жаринова [10]), то тогда $M_\mu(E_2)$, наделенное индуцированной из E_1 топологией, совпадает с $\text{ind}_n(M_\mu(E_2) \cap E_{n,1})$ и также является (DFS) -пространством. Это обстоятельство позволяет применить теорему А. Гротендика об открытом отображении (см. Приложение 1 Д. А. Райкова в книге [11], теорема 2), в соответствии с которой M_μ — топологический изоморфизм E_2 на $M_\mu(E_2)$

(инъективность оператора M_μ очевидна). Отсюда с помощью факторизационной теоремы А. Гротендика (см. [12, теорема 6.5.1]) получаем, что имеются такие $m \in \mathbb{N}$ и $C > 0$, что для всех $g \in E_2$

$$\sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|g(\lambda)|}{\exp \varphi_{m,2}(\lambda)} \leq C \sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \frac{|g(\lambda)\mu(\lambda)|}{\exp \varphi_{l,1}(\lambda)}.$$

Применив это неравенство к f вместо g и используя (2), заключаем отсюда, что $|f(\lambda)| = O(\exp \varphi_{m,2}(\lambda))$ в \mathbb{C} . При этом номер m зависит в конечном итоге лишь от k и μ . Остается воспользоваться теоремой 2 из [13], чтобы завершить доказательство. \triangleright

ЗАМЕЧАНИЕ. Две весовые последовательности неубывающих по n локально ограниченных в \mathbb{C} функций $\Phi = (\varphi_n)_{n=1}^\infty$ и $\Psi = (\psi_n)_{n=1}^\infty$ называются эквивалентными ($\Phi \sim \Psi$), если одновременно выполняются два условия:

$$(\forall k)(\exists l)(\exists C)(\forall \lambda \in \mathbb{C}) \varphi_k(\lambda) \leq \psi_l(\lambda) + C$$

и

$$(\forall n)(\exists m)(\exists D)(\forall \lambda \in \mathbb{C}) \psi_n(\lambda) \leq \varphi_m(\lambda) + D.$$

Очевидно, что если $\Phi \sim \Psi$, то пространства $E(\Phi)$ и $E(\Psi)$ совпадают между собой как множества и топологические пространства. Нетрудно также видеть, что слабая достаточность множества и нормальная разрешимость оператора умножения инвариантны относительно замены весовых последовательностей на эквивалентные. Поэтому в предложениях 1 и 2 можно вместо $\Phi_j = (\ln |e(\lambda)|_{n,j})_{n=1}^\infty$ брать любые эквивалентные им последовательности, что мы и будем делать в дальнейшем.

Покажем, как из предложений 1 и 2 можно получать критерии нормальной разрешимости операторов умножения и сюръективности операторов типа свертки. Мы рассмотрим в качестве примера пространства целых функций с заданной оценкой индикатора при порядке $\rho > 0$ и двойственные к ним пространства аналитических в (ρ, α) -выпуклых областях функций, где $\alpha(z)$ — функция вида $z^\rho(1 + \frac{a_1}{z} + \dots + \frac{a_n}{z^n})$ со специально подобранными коэффициентами a_k ($1 \leq k \leq n$). По поводу используемых ниже понятий и результатов, связанных с теорией целых функций и (ρ, α) -выпуклыми множествами, см. [14] и [15]. Отметим лишь, что частным случаем (ρ, α) -выпуклых множеств при $\alpha(z) \equiv z^\rho$ являются ρ -выпуклые (см. [16]), а, следовательно, и выпуклые (они получаются при $\rho = 1$ и $\alpha(z) \equiv z$) множества.

Пусть G — ограниченная (ρ, α) -выпуклая функция с (ρ, α) -опорной функцией $g(-\theta)$. Обозначим через $H(G)$ пространство всех аналитических в G функций, наделенное топологией равномерной сходимости на компактах из G . Эту топологию можно задать с помощью последовательности норм

$$|f|_{D_n} := \max\{|f(z)| : z \in \overline{D_n}\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

где $(D_n)_{n=1}^\infty$ — произвольно зафиксированная последовательность областей, исчерпывающая G изнутри (т. е. $G = \bigcup_{n=1}^\infty D_n$ и $\overline{D_n} \subset D_{n+1}$ при $n = 1, 2, \dots$). Как известно (см. [15, гл. 5, теорема 2.6]), обобщенное преобразование Лапласа $F \mapsto F_z(K_{\rho,\alpha}(\lambda, z))$ устанавливает топологический изоморфизм между сильным сопряженным к $H(G)$ пространством и $E(\Phi_G)$, где $\Phi_G := \left(|\lambda|^\rho(g(\arg \lambda) - 1/k)\right)_{k=1}^\infty$. Здесь $K_{\rho,\alpha}(\lambda, z)$ — целая в \mathbb{C}^2 функция, которая при $\alpha(z) = z^\rho$ есть не что иное, как функция Миттаг-Леффлера $E_{\rho,1/\rho}(z) := \sum_{k=0}^\infty z^k / \Gamma\left(\frac{k+1}{\rho}\right)$. Отметим, что $E(\Phi_G)$ совпадает с пространством $[\rho, g(\theta)]$ тех целых функций, которые имеют при порядке ρ конечные типы и индикаторы, строго

меньшие $g(\theta)$. Кроме того, мы будем еще пользоваться тем, что Φ_G эквивалентна последовательности $(\ln |K_{\rho,\alpha}(\lambda, z)|_n)_{n=1}^\infty$ (это нетрудно извлечь из контекста на С. 142–146 в [15]) и что $E(\Phi_G)$ — густое пространство (это следует из предложения 7 в [3]).

Предположим, что нам даны две ограниченные (ρ, α) -выпуклые области G_1 и G_2 с (ρ, α) -опорными функциями $g_1(-\theta)$ и $g_2(-\theta)$, причем $g_1(\theta) \equiv g_2(\theta) + h(\theta)$, где $h(\theta)$ — 2π -периодическая ρ -тригонометрически выпуклая функция. Положим $H_j := H(G_j)$, $e(\lambda) := K_{\rho,\alpha}(\lambda, z)$, $E_j := E(\Phi_{G_j}) = [\rho, g_j(\theta))$, где $j = 1, 2$ и $\lambda \in \mathbb{C}$, возьмем произвольную целую функцию μ , имеющую при порядке ρ конечный тип и индикатор, равный $h(\theta)$, и применим к этим пространствам и μ предложения 1 и 2. Отметим, что в данном случае класс мультипликаторов $M(E_2, E_1)$ совпадает с $M_0(E_2, E_1)$ и представляет собой пространство $[\rho, h(\theta)]$ всех целых функций конечного типа при порядке ρ с индикаторами при этом порядке, не превосходящими $h(\theta)$. Поэтому $\mu \in M(E_2, E_1)$.

Обозначим через $\delta(g_2)$ дополнение до \mathbb{R} множества $\text{int}\{\theta \in \mathbb{R} : g_2''(\theta) + \rho^2 g_2(\theta) = 0\}$, являющегося объединением всех интервалов ρ -тригонометричности функции g_2 , и допустим, что μ имеет вполне регулярный рост на $\delta(g_2)$. Тогда из классической теории целых функций (см. [14, гл. III]) следует, что имеется такое множество V_0 кружков с нулевой линейной плотностью (C^0 -множество), что имеет место условие:

$$(\forall n)(\exists R_n > 0) \ln |\mu(\lambda)| \geq |\lambda|^\rho (h(\arg \lambda) - 1/n)$$

для любых $\lambda \in \mathbb{C} \setminus V_0$ с $|\lambda| \geq R_n$ и $\arg \lambda \in \delta(g_2)$. Отсюда следует, что V_0 является (Φ_{G_1}, Φ_{G_2}) -исключительным множеством для μ . Далее, с помощью принципов Фрагмена — Линделефа и максимума модуля и определения C^0 -множества стандартным путем устанавливается, что $\mathbb{C} \setminus V_0$ — слабо достаточное для E_2 множество. Последнее следует также из приведенных в [17] условий слабой достаточности множеств для пространств вида $[\rho(r), g(\theta))$, где $\rho(r) \rightarrow \rho$ — уточненный порядок. Остается воспользоваться предложением 1, чтобы прийти к выводу об эпиморфности оператора $T_\mu : H(G_1) \rightarrow H(G_2)$.

Обратно, если $T_\mu(H(G_1)) = H(G_2)$, то по предложению 2 множество

$$V_{n,\mu} := \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \ln |\mu(\lambda)| \leq |\lambda|^\rho \left(h(\arg \lambda) - \frac{1}{n} \right) \right\}$$

обладает тем свойством, что $\mathbb{C} \setminus V_{n,\mu}$ слабо достаточно для E_2 при любом натуральном n . Если предположить, что $\mu(\lambda)$ не имеет полной регулярности роста на каком-либо из лучей множества $\delta(g_2)$, скажем, θ_0 , то в соответствии с [18] имеются $n_0 \in \mathbb{N}$, $\alpha_0 \in (0, 1)$ и последовательность $r_m \uparrow \infty$ такие, что $\ln |\mu(\lambda)| \leq |\lambda|^\rho \left(h(\arg \lambda) - \frac{1}{n_0} \right)$ при всех $\lambda \in K_m := \{\zeta : |\zeta - r_m e^{i\theta_0}| \leq \alpha_0 r_m\}$, $m = 1, 2, \dots$. Так как $U := \bigcup_{m=1}^\infty K_m$ содержится в $V_{n_0,\mu}$, то $\mathbb{C} \setminus V_{n_0,\mu}$ вложено в $\mathbb{C} \setminus U$. Поэтому $\mathbb{C} \setminus U$ также должно быть слабо достаточным для E_2 . А последнее невозможно, так как слабо достаточные для $E_2 = [\rho, g_2(\theta))$ множества S обладают тем свойством (см. [17], а также [19]), что для любых $\theta_0 \in \delta(g_2)$ и $\varepsilon > 0$

$$\lim_{k \rightarrow 1+0} \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\inf\{\lambda \in S : |\lambda| \geq kr, |\arg \lambda - \theta_0| \leq \varepsilon\}}{\sup\{\lambda \in S : |\lambda| \leq r, |\arg \lambda - \theta_0| \leq \varepsilon\}} = 1.$$

Итак, мы пришли к следующему результату, обобщающему известный критерий В. А. Ткаченко эпиморфности операторов типа свертки в ρ -выпуклых областях [20] и одновременно являющемуся усилением результатов Л. С. Маергойза из § 3 главы 5 в [15], в которых были установлены достаточные условия эпиморфности таких операторов в (ρ, α) -выпуклых областях (в [15] требовалось, чтобы μ имела вполне регулярный рост на всех лучах, исходящих из начала координат).

Предложение 3. Пусть G_1 и G_2 — (ρ, α) -выпуклые области с (ρ, α) -опорными функциями $g_1(-\theta)$ и $g_2(-\theta)$, причем $g_1(\theta) \equiv g_2(\theta) + h(\theta)$, где $h(\theta)$ — ρ -тригонометрически выпуклая функция, и пусть μ — произвольная целая функция, имеющая при порядке ρ конечный тип и индикатор, равный $h(\theta)$. Для того чтобы оператор свертки $T_\mu : H(G_1) \rightarrow H(G_2)$ был эпиморфизмом, необходимо и достаточно, чтобы μ имела вполне регулярный рост на множестве $\delta(g_2)$.

В заключение отметим, что предложения 1 и 2 можно использовать и для других пространств (например, для пространств ультрадифференцируемых функций). Однако это требует значительных дополнительных исследований, выходящих по объему за рамки настоящей работы.

Литература

1. Никольский С. М. Линейные уравнения в линейных нормированных пространствах // Изв. АН СССР. Сер. мат.—1943.—Т. 7, № 3.—С. 147–166.
2. Коробейник Ю. Ф. О применении теории возмущений нормально разрешимых операторов к некоторым классам операторов в комплексной области // Владикавк. мат. журн.—2005.—Т. 7, вып. 2.—С. 74–87.
3. Коробейник Ю. Ф. О мультипликаторах весовых функциональных пространств // Analysis Math.—1989.—Т. 15, № 2.—Р. 105–114.
4. Абанин А. В. Густые пространства и аналитические мультипликаторы // Изв. вузов. Сев.-Кавказ. регион. Естеств. науки.—1994.—№ 4.—С. 3–10.
5. Schneider D. M. Sufficient sets for some spaces of entire functions // Trans. Amer. Math. Soc.—1974.—V. 197.—Р. 161–180.
6. Епифанов О. В. Вариации слабо достаточных множеств в пространствах аналитических функций // Изв. вузов. Математика.—1986.—№ 7.—С. 50–56.
7. Коробейник Ю. Ф. Индуктивные и проективные топологии. Достаточные множества и представляющие системы // Изв. АН СССР. Сер. мат.—1986.—Т. 50, № 3.—С. 539–565.
8. Коробейник Ю. Ф. Представляющие системы // Успехи мат. наук.—1981.—Т. 36, № 1.—С. 73–126.
9. Коробейник Ю. Ф. Представляющие системы // Изв. АН СССР. Сер. мат.—1978.—Т. 42, № 2.—С. 325–355.
10. Жаринов В. В. Компактные семейства ЛВП и пространства FS и DFS // Успехи мат. наук.—1979.—Т. 34, № 4.—С. 97–131.
11. Робертсон А. П., Робертсон В. Дж. Топологические векторные пространства.—М.: Мир, 1967.—257 с.
12. Эдвардс Р. Функциональный анализ. Теория и приложения.—М.: Мир, 1969.—1072 с.
13. Абанин А. В. О некоторых признаках слабой достаточности // Мат. заметки.—1986.—Т. 40, № 4.—С. 442–454.
14. Левин Б. Я. Распределение корней целых функций.—М.: Гостехиздат, 1956.—632 с.
15. Маергойз Л. С. Асимптотические характеристики целых функций и их приложения в математике и биофизике.—Новосибирск: Наука, 1991.—272 с.
16. Джрбашян М. М. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной области.—М.: Наука, 1966.—672 с.
17. Абанин А. В. Распределение показателей представляющих систем обобщенных экспонент // Мат. заметки.—1991.—Т. 49, № 2.—С. 3–13.
18. Азарин В. С. О лучах вполне регулярного роста целой функции // Мат. сб.—1969.—Т. 79, № 4.—С. 463–476.
19. Абанин А. В. О свойствах и распределении на плоскости эффективных множеств // Изв. Сев.-Кав. науч. центра высш. шк. Сер. естеств. наук.—1985.—№ 3.—С. 34–37.
20. Ткаченко В. А. Уравнения типа свертки в пространствах аналитических функционалов // Изв. АН СССР. Сер. мат.—1977.—Т. 41, № 2.—С. 378–392.

Статья поступила 12 ноября 2004 г.

АБАНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, д. ф.-м. н.
г. Ростов, Ростовский государственный университет;
E-mail: abanin@math.rsu.ru