

Lineare Algebra I, Lösungshinweise zur 1. Aufgabe und zum ersten Teil der 2. Aufgabe

Aufgabe 1 (4 Punkte). Seien K und L Körper und $\varphi: K \to L$ ein Ringhomomorphismus. Zeigen Sie, dass φ injektiv ist, falls φ nicht der Nullhomomorphismus ist.

Angenommen, es gilt $\varphi(1) = 0$. Dann ist für alle $x \in K$:

$$\varphi(x) = \varphi(x \cdot 1) \stackrel{Ringhomom}{=} \varphi(x) \cdot \varphi(1) = 0$$

also ist φ der Nullhomomorphismus.

Ist also φ nicht der Nullhomomorphismus, dann ist $\varphi(1) \neq 0$. Dann gibt es das Inverse $(\varphi(1))^{-1} \in L$ und

$$\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) \stackrel{Ringhomom}{=} \varphi(1) \cdot \varphi(1)$$

impliziert

$$1 = (\varphi(1))^{-1}\varphi(1) = (\varphi(1))^{-1}(\varphi(1)\cdot\varphi(1)) \stackrel{M1}{=} \underbrace{((\varphi(1))^{-1}\varphi(1))}_{=1} \cdot \varphi(1) = \varphi(1).$$

Damit ist φ ein unitärer Ringhomomorphismus zwischen Körpern und also, siehe Vorlesung, injektiv.

Aufgabe 2 (4 Punkte). Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper und K[x] der Polynomring über K. Durch

$$(g_1, h_1) \sim (g_2, h_2) \iff g_1 \cdot h_2 = g_2 \cdot h_1$$
.

wird eine Äquivalenzrelation auf $K[x] \times (K[x] \setminus \{0\})$ definiert (dies muß nicht bewiesen werden). Sei $K(x) = \{[(g,h)] \mid (g,h) \in K[x] \times (K[x] \setminus \{0\})\}$ die Menge der Äquivalenzklassen bezüglich \sim , wir schreiben die Äquivalenzklasse von (g,h) auch kurz als $[(g,h)] = \frac{g}{h}$.

1. Zeigen Sie, dass die folgenden Verknüpfungen + und

$$\frac{g_1}{h_1} + \frac{g_2}{h_2} = \frac{g_1 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_1}{h_1 \cdot h_2}, \qquad \frac{g_1}{h_1} \cdot \frac{g_2}{h_2} = \frac{g_1 \cdot g_2}{h_1 \cdot h_2}$$

auf K(x) wohldefiniert sind.

Sei $(g_i, h_i) \sim (\tilde{g}_i, \tilde{h}_i), i = 1, 2, d.h.$

$$g_i \cdot \tilde{h}_i = \tilde{g}_i \cdot h_i, \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

+ ist wohldefiniert: Zu zeigen ist, dass

$$\frac{g_1 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_1}{h_1 \cdot h_2} = \frac{\tilde{g}_1 \cdot \tilde{h}_2 + \tilde{g}_2 \cdot \tilde{h}_1}{\tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2},$$

also

$$(g_1 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_1, h_1 \cdot h_2) \sim (\tilde{g}_1 \cdot \tilde{h}_2 + \tilde{g}_2 \cdot \tilde{h}_1, \tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2).$$

Dies ist nach Definition der Äquivalenzrelation genau dann der Fall, wenn

$$(g_1 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_1) \cdot (\tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2) = (\tilde{g}_1 \cdot \tilde{h}_2 + \tilde{g}_2 \cdot \tilde{h}_1) \cdot (h_1 \cdot h_2).$$

 $(K[x], +, \cdot)$ ist ein kommutativer Ring mit 1 (vgl. Vorlesung), also gelten in K[x] die Axiome M1, M4, D1, D2:

$$\begin{array}{ccc} (g_1 \cdot h_2 + g_2 \cdot h_1) \cdot (\tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2) & \stackrel{M1,M4,D2}{=} & (g_1 \cdot \tilde{h}_1) \cdot (h_2 \cdot \tilde{h}_2) + (g_2 \cdot \tilde{h}_2) \cdot (h_1 \cdot \tilde{h}_1) \\ & \stackrel{(1)}{=} & (\tilde{g}_1 \cdot h_1) \cdot (h_2 \cdot \tilde{h}_2) + (\tilde{g}_2 \cdot h_2) \cdot (h_1 \cdot \tilde{h}_1) \\ & \stackrel{M1,M4,D2}{=} & (\tilde{g}_1 \cdot \tilde{h}_2 + \tilde{g}_2 \cdot \tilde{h}_1) \cdot (h_1 \cdot h_2) \,. \end{array}$$

· ist wohldefiniert: Zu zeigen:

$$\frac{g_1 \cdot g_2}{h_1 \cdot h_2} = \frac{\tilde{g}_1 \cdot \tilde{g}_2}{\tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2}$$

d.h. zu zeigen:

$$(g_1 \cdot g_2) \cdot (\tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2) = (\tilde{g}_1 \cdot \tilde{g}_2) \cdot (h_1 \cdot h_2).$$

Aber es gilt

$$(g_1 \cdot g_2) \cdot (\tilde{h}_1 \cdot \tilde{h}_2) \stackrel{M1,M4}{=} (g_1 \cdot \tilde{h}_1) \cdot (g_2 \cdot \tilde{h}_2) \stackrel{(1)}{=} (\tilde{g}_1 \cdot h_1) \cdot (\tilde{g}_2 \cdot h_2) \stackrel{M1,M4}{=} (\tilde{g}_1 \cdot \tilde{g}_2) \cdot (h_1 \cdot h_2).$$